AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

GRANDES CULTURES

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 177 du 05/06/92

COLZA	Alternaria	Evolution
BLE	Maladies	Situation
	Pucerons	Vol faible
	Fusarioses épi	Le point
BETTERAVE	Pucerons	Situation
POIS	Pucerons	Très forte baisse
	Tordeuses	Situation
	Maladies	Attention au botrytis

COLZA

Allemania

☐ Situation

Cette maladie est assez rare. Les nombreuses pluies sont favorables à la montée de la maladie sur les feuilles supérieures et les siliques. Dans les parcelles où l'alternaria est très présent, on observe les tout premiers symptômes sur siliques (plaine de Troyes, région de Vitry le François).

□ Préconisation

Surveiller les parcelles. Dans la plupart des cas, il est encore trop tôt pour une éventuelle intervention.

BLE

Stade épiaison (10-5) à grain aqueux (10-5-4).

Maladies

☐ Situation

La septoriose a légèrement évolué dans les parcelles de suivi non traitées. Voici quelques résultats sur F2 :

Variété	Fréquence	Intensité	
Aube	Manual assession of a	the collection of	
Scipion	42	HOO IN SILES	
Thésée	pacers & F. Fellicaci	incirci de 5 lao	
Soisson	produit) i ne penven	ol amp a 5 io	
Marne	ios si ab nidulett	ni alimik	
Apollo	office of the guild		
Pépital	onesole8 emble plu	and a Latin	
Soisson	32	Installed 4 (In	

L'oïdium est encore bien présent et redémarre à la faveur des pluies. Voici les mêmes résultats que précédemment sur F1 et F2 :

Variété	Fréquence		Intensité	
	F1	F2	F1	F2
Aube				
Scipion	0	20	0	3
Thésée	74	94	5	10
Soisson	0	4	0	5
Marne	white			
Apollo	48	100	SHYSA.	11
Pépital	68	100	nursiq 1	12
Soisson	24	88	07 1	1

De nouvelles pustules de *rouille brune* sont observées, elles sont rares mais peuvent atteindre la F2 sur parcelles témoins (variétés Thésée et Récital).

□ Préconisation

Les interventions fongicides sont à terminer sur les parcelles non encore fleuries.

Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL :

Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.


Ministère de l'Agriculture

Service Régional de la Protection des Végétaux

240 £2, avenue Nationale - La Neuvillette

B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX Téléphone : 26.09.06.43

Fax: 26.87.39.33





Champagne-Ardenne - Le Diracteur-Gérant : J. BOUCHET - CFPPAP nº 529 AD (C SPV

Pacerons

☐ Situation

La présence de pucerons est notée mais les populations restent très faibles, sans évolution majeure.

□ Préconisation

Il est inutile d'ajouter un insecticide au fongicide.

Fusanoses des epis

Il n'y a pas de préconisation suivie d'une réussite garantie!...

En effet:

On ne sait pas les prévoir

- un temps froid en cours d'épiaison facilite l'expression de F. nivale
- un temps chaud et humide à la floraison favorise F. roseum.

Faute de prévoir de telles séquences climatiques, on ne pourrait que conseiller aux agriculteurs de se tenir prêts, cuves chargées et agitateurs ou mélangeurs tournant en permanence, à "foncer" toute affaire cessante dès les premiers orages, fin épiaison ou à la floraison. Les produits n'ayant une action manifeste qu'à quelques heures de la contamination.

On n'ose se prononcer sur l'efficacité du traitement

Outre que les produits ne peuvent être efficaces qu'à proximité du moment de la contamination, leurs efficacités sont limitées et irrégulières d'une année sur l'autre. Le tébuconazole semble plus régulier au vu des résultats d'essais en contaminations contrôlées de 1988 à 1990..

BETTERAVE

Stade 6-8 feuilles à couverture du sol.

Pucerons

☐ Situation

Voici les captures en bacs jaunes relevées le 1er juin :

Lieu	Acyrtho pisum	Myzus persicae	Macro euphorbiae	Aphis fabae
Lavannes	79	1	0 102	0
Brimont	57	1	0	0
Attigny	0	0	0	0
Sillery	des the real	oteog t as(i	De hanve	0
Connantre	101	0102	ervees! elles	0

En culture, sur 50 plantes, les comptages du 04 juin montrent la présence de pucerons verts et noirs ailés et aptères à Connantre (18 % de betteraves touchées) et aucun puceron à Attigny.

☐ Préconisation

Intervenir sur les parcelles tardives n'ayant encore reçu aucun insecticide.

= POIS ===

Stade jeunes gousses plates du 2ème niveau de fructification.

Pucerons

☐ Situation

Les populations de pucerons verts restent très variables d'une parcelle à une autre et d'un secteur à un autre : (10 % de pieds porteurs dans la région de Reims à 95 % de pieds porteurs en plaine de Troyes).

□ Préconisation

L'intervention n'est que très rarement justifiée.



☐ Situation

Le vol se poursuit sur l'ensemble de la région mais le nombre de captures cumulées est encore relativement faible.

Situation au 3/06

LIEU	CAPTURES CUMULEES	
10 Planty	152 moiseutie C	-
Villiers/Praslin	4	
St Lupien	Cette majedie est a	
Charny le Bachot	and a soliday over those soliday	
Pouan les Vallées	feuilles superio 22 et les	
Charmont	iq sən 127 akınırınılır'i do	
Chaudrey	premiers symp 8 mes sur	
	found 114 vitiV eb noise	
Bussy-Lettrée	107	
La Chaussée/M	1	
Cormontreuil	Preconisation	
Lavannes	Survelliet burd	
Pontgivart	cas, il est en ere trop	
52 Crenay	intervention 0.	

☐ Préconisation

Ne pas traiter, le seuil n'est atteint dans aucun secteur.



☐ Situation

La succession des pluies de ces derniers jours est très favorable au développement du *botrytis*.

☐ Préconisation

Il devient urgent d'intervenir dès que possible.

Pour consulter nos conseils sur Minitel, appelez le 3617 code SIRTEL